OSPEDALE SACRO CUORE DI GESÙ - FATEBENEFRATELLI
BENEVENTO

UOC RADIOLOGIA DIAGNOSTICA

Servizio di Diagnostica per Immagini
Direttore: dott. Carmine Manganiello

TAC MULTISLICES – ECOGRAFIA – MAMMOGRAFIA 3D RISONANZA MAGNETICA – RADIOLOGIA DIGITALE

Tel. 0824-771111 (Centralino); 0824-771461 (Accettazione Radiologica); 0824-771464 (TAC); 0824-771630 (RMN)
Per prenotazioni tel 0824-771456 o agli sportelli CUP

ESAMI NECESSARI PER ESEGUIRE LE INDAGINI CON IL MEZZO DI CONTRASTO:

TAC E UROGRAFIA	RISONANZA MAGNETICA
- AZOTEMIA;	- AZOTEMIA;
- GLICEMIA;	- GLICEMIA;
- CREATINEMIA;	- CREATINEMIA
- TRANSAMINASI;	
- BILIRUMINEMIA TOTALE e FRAZIONATA;	
- QUADRO PROTEICO ELETTROFORETICO;	
- E.C.G.	

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO PER PAZIENTI CON DIATESI ALLERGICA

In relazione alla Sua anamnesi positiva per diatesi allergica, Le suggeriamo di sottoporsi al seguente schema di premedicazione da condividere con il Suo Medico di Medicina Generale*:

1) Prednisone 50 mg/os (**Deltacortene** forte 25 mg 1 cp) 13 ore prima, 7 ore prima e 1 ora prima dell'esecuzione dell'esame;

2) Omeprazolo 20mg (**Omeprazolo** 20 mg 1 cp) Da assumere 10 minuti prima della terapia cortisonica (13 ore prima, 7 ore prima, e un'ora prima dell'esame);

3) Antistaminico [Es. Cetirizina (**Zirtec** 1cp) OPPURE Desclorfeniramina (Polaramin 1 cp)] 1 ora prima dell'esecuzione dell'esame.

*Linee Guida SIRM-SIAAIC

RACCOMANDAZIONI

Il paziente deve osservare il digiuno di 8 ore prima di eseguire l'esame con mezzo di contrasto.
Per le donne in età fertile è preferibile eseguire gli esami radiologici nei primi 10 giorni del ciclo (*avvertire il radiologo in caso di sospetta gravidanza*);
Segnalare manifestazioni di allergia alla somministrazione endovena di mezzo di contrasto o, comunque, positività allergica a farmaci o allergie stagionali.
Esibire esami radiografici, ecografici, TAC o RM precedentemente eseguiti.

L'esame verrà eseguito il giorno: **alle ore:**