



**CONSENSO INFORMATO PER BIOPSIA PROSTATICA
TRANS-RETTALE**

INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE

**Responsabile
Dott. A. Russo**

Dirigenti Medici
Dott. G. Castelluzzo

Capo sala
Suor Suma Celine

La biopsia prostatica per via trans-rettale è un'indagine necessaria per evidenziare o escludere la presenza di patologie degenerative neoplastiche a carico dell'organo.

Tale indagine consente difatti il prelievo di uno o più frustoli di tessuto che verrà esaminato dagli anatomo-patologi per la diagnosi istologica del reperto.

Tale indagine prevede l'introduzione nel retto, sotto guida manuale od ecografica, di un ago che raggiungerà il parenchima ghiandolare prostatico nelle zone che si vogliono esaminare.

La piccola lesione determinata dall'ago può essere fonte di sanguinamenti prolungati sia per via rettale(rettorragie) sia per via uretrale (uretrorragie), con possibilità di formazione di ematomi. Inoltre si possono verificare infezioni locali o sistemiche con eventuale formazione di piccoli ascessi intraprostatici.

Per ognuno degli effetti collaterali per i quali potrebbero essere necessarie procedure terapeutiche immediate ed occorrerà contattare quanto prima il medico referente. Inoltre la negatività della risposta istologica non esclude la presenza di un carcinoma prostatico e, se le condizioni cliniche e di laboratorio lo dovessero richiedere, potrà essere necessario eseguire una nuova biopsia prostatica.

Ho ricevuto, letto e compreso le informazioni circa la biopsia trans-rettale. Ho avuto la possibilità di avere tutti i chiarimenti dal mio medico Dott.....

Acconsento pertanto a praticare questa procedura diagnostica conscio della possibilità che ci possano essere i suddetti effetti collaterali o indesiderati.

NOME DEL PAZIENTE: _____

DATA/FIRMA DEL PAZIENTE: _____

FIRMA DEL MEDICO: _____



PREPARAZIONE ALLA BIOPSIA PROSTATICA:

- **Bactrim** cpr1 mattina e sera da 2 giorni prima della biopsia (in caso di allergie effettuare terapia antibiotica suggerita dal medico di Base);

- Si richiedono i seguenti esami: EMOCROMO COMPLETO, T.DI QUICK., aPTT e FIBRINOGENIA, MARKERS EPATICI, ECG.
- In caso di utilizzo di farmaci antiaggreganti o anticoagulanti concordare la sospensione del trattamento con lo specialista che ha prescritto la terapia.
- Si consiglia di fare colazione la mattina della biopsia.
- Comunicare al sanitario eventuali allergie e terapie croniche in atto.
- Portare in visione RM se effettuata
- effettuare clistere evacuativo (250cc) la mattina della procedura
- L'operatore di turno valuterà la adeguatezza della richiesta

Dopo la biopsia dovrà essere continuata la terapia antibiotica in accordo con il sanitario.

Sono necessarie 2 ricette: 1) Agobiopsia Transperineale Prostata Ecoguidata

60.11.0.001

2) Esame istologico biopsia prostatica 91.44.1